

附錄 5**藥物引致/相關的身體障礙資料系列**

身體障礙	牽涉的藥物
<p>• HIV 病毒感染</p> <p>這肯定是使用針筒注射藥物最主要的併發症。HIV 病毒感染及肝炎均有可能因共用注射用具傳播。</p>	<p>常見的注射藥物為海洛英，亦可能是苯二氮草類、巴比士酸鹽、安非他明、可卡因及同化性-雄性類固醇激素。</p>
<p>• 黃疸病、乙型及丙型肝炎</p> <p>乙型及丙型肝炎在使用針筒注射藥物的人當中頗為常見。感染肝炎者可能全無症狀，亦可以急劇發病，漸變成長期帶菌者，發展成慢性活躍肝炎或肝癌。</p>	<p>同上</p>
<p>• 蜂窩組織炎、血栓性靜脈炎、膿腫、無痛的潰瘍</p> <p>使用針筒注射藥物的人中常見的皮膚問題。</p>	<p>同上</p>
<p>• 菌血症、敗血症、念珠菌病</p> <p>可能是濫用藥物*的抑制免疫力作用，病源是局部感染區(例：膿腫)。</p>	<p>同上</p> <p>(*抑制免疫力的藥物包括:酒精、鴉片類、大麻及可卡因)</p>
<p>• 深靜脈栓塞 肺血栓栓塞(肺部有血塊)</p> <p>常見於長期鼠蹊注射者、在其經常注射的位置會有靜脈竇。</p>	<p>同上</p>
<p>• 淋巴管炎、淋巴水腫</p> <p>在不斷注射肢體的表層受感染而導致淋巴管道閉塞。</p>	<p>同上</p>

身體障礙	牽涉的藥物
<ul style="list-style-type: none"> • 肝臟毛病 <p>肝臟受損，甚至引致肝臟衰竭。</p>	<p>毒害肝臟的藥物包括揮發性溶劑、MDMA(搖頭丸)、可卡因及同化性-雄性類固醇激素。若同時濫用酒精，發生的可能性會更高。</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 呼吸系統毛病 <ul style="list-style-type: none"> - 用口吸入藥物有可能引致咽炎、支氣管炎、哮喘、肺炎及肺結核病 - 鼻吸入藥物有可能引起鼻中隔穿孔 - 「克賴克肺」或鴉片類引致的哮喘可引發急性呼吸困難，導致死亡 	<ul style="list-style-type: none"> - 海洛英、大麻、甲基安非他明(「冰」)、揮發性溶劑 - 可卡因、海洛英、氯胺酮(「K仔」) - 可卡因、海洛英
<ul style="list-style-type: none"> • 心血管系統毛病 <ul style="list-style-type: none"> - 藥物引致的高血壓 - 藥物引致的低血壓 - 原先受損的心瓣會因膿毒病而導致傳染性心內膜炎 - 藥物的毒性導致中毒性心肌病、心律不常、心肌梗塞：全部都可致命 	<ul style="list-style-type: none"> - 安非他明、可卡因、大麻、MDMA(搖頭丸)、LSD、PCP、咳藥、氯胺酮(「K仔」)、同化性-雄性類固醇激素 - 巴比士類、苯二氮草類、GHB(「迷姦水」) - (用注射方法吸食)：海洛英、苯二氮草類、巴比士類、安非他明、可卡因 - 揮發性溶劑、安非他明、可卡因、MDMA(搖頭丸)、PCP、同化性-雄性類固醇激素
<ul style="list-style-type: none"> • 肌肉、骨、關節毛病 <ul style="list-style-type: none"> - 關節因直接受感染而引起關節毛病，以及因膿毒性血栓而導致骨感染(骨髓炎) - 橫紋肌溶解 – 因骨骼肌壞死，肌肉組織被釋放於血液中，可以帶來腎衰竭及死亡 	<ul style="list-style-type: none"> - (用注射方法吸食)：海洛英、苯二氮草類、巴比士類、安非他明、可卡因 - 所有被濫用的藥物，尤其是海洛英、安非他明、可卡因、MDMA(搖頭丸)

身體障礙	牽涉的藥物
<ul style="list-style-type: none"> • 腎臟毛病 - 濫用藥物引致腎臟受感染(腎小球腎炎)及腎臟受損 - 腎衰竭 	<ul style="list-style-type: none"> - (用注射方法吸食)：海洛英、苯二氮草類、巴比士類、安非他明、可卡因 - MDMA(搖頭丸)、海洛英、可卡因、安非他明、揮發性溶劑、PCP
<ul style="list-style-type: none"> • 神經系統毛病 - 在藥物的影響下，呼吸抑壓、意識抑壓和咳嗽反射抑壓，導致呼吸道被唾液、黏液、或嘔吐物等阻塞，造成腦部缺氧和損害 - 血壓急劇上升引致腦出血中風(興奮劑)；如患有先天性變異無徵狀小動脈瘤的人，中風的危險性更高 - 癲癇(羊癇症)發作 	<ul style="list-style-type: none"> - 鴉片類、巴比士類、苯二氮草類、GHB(「迷姦水」)、揮發性溶劑、氯胺酮(「K仔」) - 安非他明、可卡因、LSD、MDMA(搖頭丸) - 可卡因、安非他明、鎮靜催眠藥(戒斷期間)、MDMA(搖頭丸)、GHB(「迷姦水」)
<ul style="list-style-type: none"> • 生殖/新生兒 - 流產、早產、死產 - 胎兒先天異常 - 新生兒戒斷綜合症 - 新生兒感染(HIV 病毒、肝炎) 	<ul style="list-style-type: none"> - 鴉片類(戒斷及中毒期間)、可卡因、鎮靜催眠藥、酒精、MDMA(搖頭丸)、安非他明 - LSD、MDMA(搖頭丸)、可卡因 - 鴉片類、巴比士類、苯二氮草類 - 可注射的藥物，尤其是海洛英

藥物引致/相關的身體障礙繁多，未能盡錄。個別被濫用的藥物可以引致林林種種疾病，其中包括血液、內分泌、維他命、電解質及代謝物、免疫系統、體溫調節、腸胃、牙齒口腔等方面的問題。我們需要注意各種濫用藥物無數的可能組合、非法藥物和合法藥物的混合、濫用藥物內的各種雜質/添加劑等等都可以導致身體損害，這些資料則未能在此詳述。