

海洛英

鴉片、嗎啡及海洛英均源於罌粟 (Papaver somniferum)，因此通常稱為鴉片類藥物，屬麻醉鎮痛劑一類，能紓緩或鎮靜腦部活動。

俗稱

白粉、粉、灰、四仔、美金、港紙

表狀

純海洛英是一種白色結晶粉末，流行於街頭的品種，由白色至淺灰色皆有，純度不一。本地供應的海洛英通常有不同的物質摻雜，例如：咖啡因（興奮劑）、撲熱息痛（止痛劑）、撲爾敏（抗組織胺劑）、茶鹹（支氣管抗張劑）、安替比林（退熱劑）、咳必清（止咳劑）、苯巴比妥（鎮抑劑）、咪達唑侖（鎮靜劑）及舒樂安定（鎮靜劑）。

效果及危險

海洛英可用作強力麻醉鎮痛劑，具鎮痛及鎮靜神經功效。同時，它能予人一種欣快和舒適的感覺，海洛英經注射後，會迅即抵達腦部，產生即時效果。加上其鎮痛及欣快效果，海洛英是麻醉／鎮痛劑中最容易成癮的藥物，若停止吸食，則斷癮症狀會於上次服用後 8 至 12 小時內出現，這些症狀包括出汗、緊張、無法入睡、腸胃不適、四肢劇痛及痙攣，耐藥量更會迅速產生。為達到相同效果，服用者需要加重劑量，當加重劑量也無法產生原先效果時，服用者就純為防止斷癮症狀而繼續服用海洛英。

其他不良反應

- 情緒不穩定
- 性衝動減弱
- 便秘
- 月經失調
- 呼吸不暢順

服用過量海洛英會產生下列效果

- 沉睡及可能導致昏迷
- 血壓低
- 心跳緩慢及不規律

- 血液缺氧
- 呼吸緩慢及呼吸量淺
- 皮膚濕冷

特有危險

將海洛英注射入血管內（靜脈注射）能產生最強烈和迅速的反應，但自我注射要求高度的個人衛生，否則可引致嚴重的感染（如肝炎或愛滋病）。而一些較難溶於水的物質如咖啡因可能會凝結注射部位的血管，導致該部位附近的肌肉壞死。

法律方面

根據《危險藥物條例》，海洛英屬危險藥物，如非法製造、藏有或供應海洛英，均屬違法。