

**表三 按年齡組別及常被吸食毒品種類劃分的首次/曾被呈報吸食毒品人士**

年齡組別 / 常被吸食毒品種類	2017		2018		2019		2019 上半年		2020 上半年	
	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *
<b>首次被呈報人士</b>										
<b>廿一歲以下</b>										
海洛英	9	2.6	10	2.8	9	2.5	7	4.0	@	@
危害精神毒品	337	98.0	349	98.0	353	98.3	172	97.7	165	98.8
甲基安非他明(冰毒)	94	27.3	61	17.1	49	13.6	27	15.3	12	7.2
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	@	@	@	@	-	-	-	-	-	-
可卡因	176	51.2	197	55.3	145	40.4	62	35.2	60	35.9
大麻	111	32.3	130	36.5	190	52.9	99	56.3	88	52.7
氯胺酮	25	7.3	26	7.3	35	9.7	18	10.2	24	14.4
咳藥	7	2.0	@	@	@	@	@	@	@	@
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	@	@	@	@	9	2.5	@	@	@	@
硝甲西洋(五仔)	@	@	@	@	@	@	@	@	-	-
<b>廿一歲及以上</b>										
海洛英	196	15.6	214	16.1	172	15.3	74	11.1	78	16.7
危害精神毒品	1 091	86.9	1 159	87.3	983	87.7	612	91.6	409	87.4
甲基安非他明(冰毒)	459	36.6	479	36.1	402	35.9	242	36.2	150	32.1
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	84	6.7	100	7.5	100	8.9	56	8.4	31	6.6
可卡因	276	22.0	316	23.8	234	20.9	139	20.8	94	20.1
大麻	167	13.3	178	13.4	147	13.1	104	15.6	103	22.0
氯胺酮	175	13.9	157	11.8	115	10.3	65	9.7	58	12.4
咳藥	99	7.9	102	7.7	91	8.1	61	9.1	37	7.9
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	10	0.8	11	0.8	8	0.7	@	@	6	1.3
硝甲西洋(五仔)	16	1.3	6	0.5	-	-	-	-	@	@
<b>所有年齡</b>										
海洛英	205	12.8	224	13.3	181	12.2	81	9.6	81	12.8
危害精神毒品	1 428	89.3	1 508	89.6	1 336	90.3	784	92.9	574	90.4
甲基安非他明(冰毒)	553	34.6	540	32.1	451	30.5	269	31.9	162	25.5
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	85	5.3	103	6.1	100	6.8	56	6.6	31	4.9
可卡因	452	28.3	513	30.5	379	25.6	201	23.8	154	24.3
大麻	278	17.4	308	18.3	337	22.8	203	24.1	191	30.1
氯胺酮	200	12.5	183	10.9	150	10.1	83	9.8	82	12.9
咳藥	106	6.6	106	6.3	95	6.4	63	7.5	38	6.0
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	12	0.8	16	1.0	17	1.1	8	0.9	9	1.4
硝甲西洋(五仔)	18	1.1	9	0.5	@	@	@	@	@	@

**表三 (續) 按年齡組別及常被吸食毒品種類劃分的首次/曾被呈報吸食毒品人士**

年齡組別 / 常被吸食毒品種類	2017		2018		2019		2019 上半年		2020 上半年	
	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *
<b>曾被呈報人士</b>										
<b>廿一歲以下</b>										
海洛英	6	5.3	@	@	@	@	@	@	@	@
危害精神毒品	110	96.5	101	96.2	101	96.2	89	96.7	102	99.0
甲基安非他明(冰毒)	46	40.4	26	24.8	16	15.2	13	14.1	12	11.7
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	-	-	-	-	-	-	-	-	@	@
可卡因	57	50.0	62	59.0	58	55.2	49	53.3	40	38.8
大麻	18	15.8	24	22.9	38	36.2	35	38.0	49	47.6
氯胺酮	12	10.5	9	8.6	10	9.5	7	7.6	8	7.8
咳藥	@	@	-	-	-	-	-	-	-	-
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	-	-	@	@	@	@	@	@	@	@
硝甲西洋(五仔)	-	-	@	@	@	@	@	@	@	@
<b>廿一歲及以上</b>										
海洛英	3 511	68.7	3 398	69.6	2 687	68.2	1 769	65.4	1 967	72.7
危害精神毒品	2 549	49.9	2 391	49.0	2 034	51.7	1 420	52.5	1 142	42.2
甲基安非他明(冰毒)	1 189	23.3	1 004	20.6	824	20.9	581	21.5	486	18.0
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	801	15.7	823	16.9	738	18.7	463	17.1	354	13.1
可卡因	363	7.1	413	8.5	314	8.0	230	8.5	178	6.6
大麻	108	2.1	151	3.1	131	3.3	95	3.5	77	2.8
氯胺酮	415	8.1	309	6.3	245	6.2	171	6.3	149	5.5
咳藥	165	3.2	174	3.6	157	4.0	110	4.1	78	2.9
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	17	0.3	24	0.5	18	0.5	10	0.4	7	0.3
硝甲西洋(五仔)	12	0.2	14	0.3	11	0.3	11	0.4	7	0.3
<b>所有年齡</b>										
海洛英	3 517	67.3	3 402	68.2	2 691	66.6	1 772	63.3	1 969	70.1
危害精神毒品	2 659	50.9	2 492	50.0	2 135	52.8	1 509	53.9	1 244	44.3
甲基安非他明(冰毒)	1 235	23.6	1 030	20.7	840	20.8	594	21.2	498	17.7
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	801	15.3	823	16.5	738	18.3	463	16.5	355	12.6
可卡因	420	8.0	475	9.5	372	9.2	279	10.0	218	7.8
大麻	126	2.4	175	3.5	169	4.2	130	4.6	126	4.5
氯胺酮	427	8.2	318	6.4	255	6.3	178	6.4	157	5.6
咳藥	166	3.2	174	3.5	157	3.9	110	3.9	78	2.8
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	17	0.3	25	0.5	21	0.5	13	0.5	10	0.4
硝甲西洋(五仔)	12	0.2	15	0.3	12	0.3	12	0.4	9	0.3

**表三 (續) 按年齡組別及常被吸食毒品種類劃分的首次/曾被呈報吸食毒品人士**

年齡組別 / 常被吸食毒品種類	2017		2018		2019		2019 上半年		2020 上半年	
	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *
所有被呈報人士										
廿一歲以下										
海洛英	15	3.3	14	3.0	13	2.8	10	3.7	@	@
危害精神毒品	447	97.6	450	97.6	454	97.8	261	97.4	267	98.9
甲基安非他明(冰毒)	140	30.6	87	18.9	65	14.0	40	14.9	24	8.9
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	@	@	@	@	-	-	-	-	@	@
可卡因	233	50.9	259	56.2	203	43.8	111	41.4	100	37.0
大麻	129	28.2	154	33.4	228	49.1	134	50.0	137	50.7
氯胺酮	37	8.1	35	7.6	45	9.7	25	9.3	32	11.9
咳藥	8	1.7	@	@	@	@	@	@	@	@
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	@	@	6	1.3	12	2.6	7	2.6	6	2.2
硝甲西洋(五仔)	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
廿一歲及以上										
海洛英	3 707	58.3	3 612	58.2	2 859	56.5	1 843	54.6	2 045	64.4
危害精神毒品	3 640	57.2	3 550	57.2	3 017	59.6	2 032	60.2	1 551	48.9
甲基安非他明(冰毒)	1 648	25.9	1 483	23.9	1 226	24.2	823	24.4	636	20.0
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	885	13.9	923	14.9	838	16.6	519	15.4	385	12.1
可卡因	639	10.0	729	11.7	548	10.8	369	10.9	272	8.6
大麻	275	4.3	329	5.3	278	5.5	199	5.9	180	5.7
氯胺酮	590	9.3	466	7.5	360	7.1	236	7.0	207	6.5
咳藥	264	4.1	276	4.4	248	4.9	171	5.1	115	3.6
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	27	0.4	35	0.6	26	0.5	14	0.4	13	0.4
硝甲西洋(五仔)	28	0.4	20	0.3	11	0.2	11	0.3	8	0.3
所有年齡										
海洛英	3 722	54.6	3 626	54.4	2 872	52.0	1 853	50.9	2 050	59.5
危害精神毒品	4 087	59.9	4 000	60.0	3 471	62.9	2 293	63.0	1 818	52.8
甲基安非他明(冰毒)	1 788	26.2	1 570	23.5	1 291	23.4	863	23.7	660	19.2
三唑侖 / 咪達唑侖 / 佐匹克隆	886	13.0	926	13.9	838	15.2	519	14.3	386	11.2
可卡因	872	12.8	988	14.8	751	13.6	480	13.2	372	10.8
大麻	404	5.9	483	7.2	506	9.2	333	9.1	317	9.2
氯胺酮	627	9.2	501	7.5	405	7.3	261	7.2	239	6.9
咳藥	272	4.0	280	4.2	252	4.6	173	4.8	116	3.4
亞甲二氧基甲基安非他明(搖頭丸)	29	0.4	41	0.6	38	0.7	21	0.6	19	0.6
硝甲西洋(五仔)	30	0.4	24	0.4	14	0.3	13	0.4	10	0.3

- 註釋：
1. 本表只根據檔案室所得的呈報資料作出分析，因此並不包括該些未有就有關資料項目（除年齡和性別外）提供的人士。用者須注意只有表1、2及11載列在不同年齡及性別組別內所有被呈報吸食毒品人士總數。
  2. 同一被呈報吸食毒品人士可被呈報多於一種毒品種類。
  3. \* 佔在相關年齡及首次/曾被呈報組別內所有被呈報吸食毒品人士的百分比。
  4. @ 數字少於6
  5. - 無

**表三（續） 按年齡組別及常被吸食毒品種類劃分的首次/曾被呈報吸食毒品人士**

年齡組別 / 常被吸食毒品種類	2017		2018		2019		2019 上半年		2020 上半年	
	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *	數目	% *

資料來源：藥物濫用資料中央檔案室  
資料更新於 16.09.2020